



التبول المتكرر؟
صعوبة بدء أو إيقاف
التبول؟

قد تكون مصابًا
بتضخم البروستاتا



NORTH STAR
PROSTATE CENTER

علاج فعال وغير جراحي لتضخم البروستاتا الحميد


تضخم البروستاتا شائع مع تقدم الرجال في العمر. تُعرف (BPH) هذه الحالة باسم تضخم البروستاتا الحميد وهي غير سرطانية وتصيب نصف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 عامًا، وتصل إلى 90% من الرجال فوق 80 عامًا. حوالي 14 مليون رجل أمريكي مصابون ب

قح غدة البروستاتا بجانب المثانة. مع نموها، تضغط على الإحليل وقد تعيق تدفق البول. معظم الرجال غير راضين عن هذه الحالة ولا يرغبون BPH المصابين ب في العيش ببقية حياتهم مع أعراضها، والتي تشمل عادة:

- (الحاجة المتكررة أو الملحة للتبول (خاصة ليلاً
- ضعف تدفق البول
- صعوبة بدء التبول أو تنقيط البول في النهاية
- عدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل

يرتبط تضخم البروستاتا الحميد أيضًا بضعف الانتصاب وانخفاض الرغبة الجنسية. إذا تُرك دون علاج، قد يؤدي إلى التهابات المسالك البولية، تلف المثانة، حصوات المثانة، تلف الكلى (أو الفشل الكلوي المزمن)، واحتباس البول (عدم القدرة على التبول)

تضخم البروستاتا الحميد



مناسب لي PAE؟ هل إجراء

للمرضى الذين يُنصح بإجراء

- يعانون من تضخم البروستاتا (أكثر من 50 جرامًا)
- بالأدوية BPH لم يتمكنوا من السيطرة على أعراض
- يعانون من نزيف بوليّ مستعصٍ
- لا يرغبون في الخضوع للجراحة
- مرضى عاليو الخطورة للجراحة
- يتناولون أدوية مضادة للتخثر
- مدخنون

إذا تم تشخيصك BPH. هو خيار أقل توغلاً لعلاج PAE بتضخم البروستاتا، اتصل بنا لجدولة استشارة. سنعمل مع طبيبك بكل سرور، وإذا لم يكن على دراية بـ PAE، سنزوده بمعلومات عن الإجراء وسجله الآمن.





خيارات العلاج

BPH يمكن علاج الرجال ذوي الأعراض الخفيفة لـ بتغييرات في نمط الحياة، الأدوية، أو المكملات. قد يطلب منك طبيبك أيضًا تجنب أدوية معينة مثل مزيلات الاحتقان أو بعض مضادات الهيستامين التي تؤثر على البروستاتا.

باستئصال البروستاتا BPH قد تُعالج الأعراض الشديدة. وهي عملية جراحية تتطلب (TURP) عبر الإحليل TURP تخديرًا. للأسف، الآثار الجانبية شائعة مع عمليات وتشمل العدوى، خلل الوظيفة الجنسية، والقذف المرتد.

في 2018، FDA إجراء جديد وقليل التوغل وافق عليه ال هو خيار علاجي (PAE) يُعرف بانسداد الشريان البروستاتي هذا الإجراء BPH ممتاز للرجال ذوي الأعراض الشديدة لـ السريع الذي لا يتطلب دخول المستشفى قد يخفف الأعراض لمعظم الرجال دون الحاجة إلى جراحة.


ماذا يحدث عندما تكبر البروستاتا؟

الحميد، قد يصل حجمها إلى كرة التنس. يزيد الضغط على الإحليل البولية)، مما يعيق تدفق البول أو يوقفه تمامًا في الحالات الشديدة

جاء انسداد الشريان البروستاتي

يتم إجراء انسداد الشريان البروستاتي بواسطة أخصائي الأشعة التدخلي الذي يدخل قسطرة صغيرة عبر شريان في الفخذ أو الرسغ، ثم يوجهها عبر الأوعية الدموية إلى شرايين البروستاتا باستخدام التصوير. تُحقن حبيبات صغيرة تُسمى "الميكروسفيرات" عبر القسطرة إلى الشرايين، مما يقلل تدفق الدم إلى البروستاتا. مع انخفاض تدفق الدم، تنقل البروستاتا وتختفي الأعراض.

لا يتطلب تخديرًا أو PAE فإن إجراء TURP، على عكس دخول المستشفى. يتميز بنسبة نجاح عالية (75-95%)، وتعافٍ أسرع، ومضاعفات أقل، ومخاطر أقل بكثير للآثار الجانبية الجنسية.



البروستاتا هي غدة بحجم الجوزة عادةً. مع تضخم البروستاتا (القناة).

North Star Vascular & Interventional

روداد في مجال الأشعة التداخلية. NSVI أطباء أول NSVI في الواقع، كان الدكتور جولزاريان من PAE. طبيب في الولايات المتحدة يُجري إجراء بنسبة نجاح PAE أجرينا أكثر من 500 عملية تفوق المتوسط الوطني. حتى أننا نجحنا في إجراء لديهم في PAE العملية لمرضى فشل إجراء أماكن أخرى.

يمتد تأثير الدكتور جولزاريان عالمياً، حيث للأطباء PAE يسافر حول العالم لتعليم تقنية المتخصصين في الأشعة التداخلية. هذا الالتزام بتطوير المجال وتحقيق نتائج استثنائية يجعلنا الخيار الموثوق للمرضى الباحثين عن أفضل NorthStarIR.com للمزيد، زوروا PAE. علاج بـ



NORTH STAR
PROSTATE CENTER



NorthStarIR.com

رقم
رقم

عنوان
عُزْفَة
عنوان